

HPVワクチンの比較	サーバリックス	ガーダシル	シルガード9
予防できるヒトパピローマウイルス (HPV)のタイプ	16型、18型 (子宮頸がんに関与) の2価	16型、18型 (子宮頸がんに関与) (肛門癌に関与) 6型、11型 (尖圭コンジローマにも関与) で4価	16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型 (子宮頸がんに関与) 6型、11型 (尖圭コンジローマにも関与) の9価
接種方法	0・1・6 カ月の3回 筋肉注射	0・2・6カ月の3回 筋肉注射	0・2・6カ月の3回 筋肉注射
接種場所	上腕三角筋	上腕三角筋 または大腿四頭筋	上腕三角筋 または大腿四頭筋
接種年齢	10歳以上の女子	9歳以上の男女	9歳以上の女子
子宮がん検診の必要性	必要	必要	必要
副反応	612 例中 疼痛 99.0% 紅斑 88.2% 腫脹 78.8%	562 例中 疼痛 82.7% 紅斑 32.0% 腫脹 28.3%	254 例中 疼痛 81.9% 紅斑 40.2% 腫脹 44.9%
費用	16,000 円 (税込) /回	16,000 円 (税込) /回	28,000 円 (税込) /回
接種自己負担	定期接種は無料	定期接種は無料	任意接種 自費

定期接種の対象：小学6年生～高校1年生の女子

てらだアレルギーこどもクリニック 令和3年4月30日